

CAPACIDAD DE DIFUSION

Es una prueba que permite medir el intercambio gaseoso y obtener información completa de cómo funcionan los pulmones, es útil para evaluar la efectividad del tratamiento.

Beneficios

Es una prueba de función pulmonar rutinaria y no invasiva de mayor utilidad clínica midiendo la capacidad del intercambio gaseoso y obtener información completa de cómo funciona los pulmones

Preparación:

1. No fumar al menos 24 horas previas a la misma.
2. Que no haya usado broncodilatadores en horas previas así: Acción corta (Salbutamol, Terbutalina) - 8 horas antes.
Acción media (Ipratropio) - 24 horas antes
Acción prolongada (Formoterol + Salmeterol tiotropio - 12 horas antes.
Teofilina - 8 horas antes.
Antihistaminicos (Hidroxicina, Cetirizina) - 3 días antes.
Antileucotrienos (Montelukast, Zafirlukast) - 24 horas antes.
3. Que no haya tomado: Café, chocolate, té, comidas copiosas (No es necesario que el paciente este en ayunas).
4. Informe al profesional si presenta alguna condición médica que le impida realizar esfuerzo.
5. No requiere ayuno, pero se recomienda comer liviano hasta 2 horas antes.
6. Venir sin esmalte, ni base en las uñas de las manos.
7. Debe estar con la vejiga desocupada.
8. Si tiene soporte de oxígeno porfavor no suspenderlo
9. Evitar ejercicio intenso 4 horas antes.
10. No suspenda medicación.
11. Llegar con tiempo para un reposo de unos 15 minutos.